






美. 如图, 某坡屋顶可视为一个五面体, 其中两个面是全等的等腰梯形, 两个面是全等的等腰三角形. 若  $AB = 25\text{m}, BC = AD = 10\text{m}$ , 且等腰梯形所在的平面、等腰三角形所在的平面与平面  $ABCD$  的夹角的正切值均为  $\frac{\sqrt{14}}{5}$ , 则该五面体的所有棱长之和为 ( )



- A. 102m  
B. 112m  
C. 117m  
D. 125m

10. 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6(n=1, 2, 3, \dots)$ , 则 ( )

- A. 当  $a_1 = 3$  时,  $\{a_n\}$  为递减数列, 且存在常数  $M \leq 0$ , 使得  $a_n > M$  恒成立  
B. 当  $a_1 = 5$  时,  $\{a_n\}$  为递增数列, 且存在常数  $M \leq 6$ , 使得  $a_n < M$  恒成立  
C. 当  $a_1 = 7$  时,  $\{a_n\}$  为递减数列, 且存在常数  $M > 6$ , 使得  $a_n > M$  恒成立  
D. 当  $a_1 = 9$  时,  $\{a_n\}$  为递增数列, 且存在常数  $M > 0$ , 使得  $a_n < M$  恒成立

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. 已知函数  $f(x) = 4^x + \log_2 x$ , 则  $f\left(\frac{1}{2}\right) =$  \_\_\_\_\_.

12. 已知双曲线  $C$  的焦点为  $(-2, 0)$  和  $(2, 0)$ , 离心率为  $\sqrt{2}$ , 则  $C$  的方程为 \_\_\_\_\_.

13. 已知命题  $p$ : 若  $\alpha, \beta$  为第一象限角, 且  $\alpha > \beta$ , 则  $\tan \alpha > \tan \beta$ . 能说明  $p$  为假命题的一组  $\alpha, \beta$  的值为  $\alpha =$  \_\_\_\_\_,  $\beta =$  \_\_\_\_\_.

14. 我国度量衡的发展有着悠久的历史, 战国时期就已经出现了类似于砝码的、用来测量物体质量的“环权”. 已知 9 枚环权的质量 (单位: 铢) 从小到大构成项数为 9 的数列  $\{a_n\}$ , 该数列的前 3 项成等差数列, 后 7 项成等比数列, 且  $a_1 = 1, a_5 = 12, a_9 = 192$ , 则  $a_7 =$  \_\_\_\_\_; 数列  $\{a_n\}$  所有项的和为 \_\_\_\_\_.

15. 设  $a > 0$ , 函数  $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < -a, \\ \sqrt{a^2 - x^2}, & -a \leq x \leq a, \\ -\sqrt{x} - 1, & x > a. \end{cases}$  给出下列四个结论:

- ①  $f(x)$  在区间  $(a-1, +\infty)$  上单调递减;  
② 当  $a \geq 1$  时,  $f(x)$  存在最大值;  
③ 设  $M(x_1, f(x_1))(x_1 \leq a), N(x_2, f(x_2))(x_2 > a)$ , 则  $|MN| > 1$ ;




④设  $P(x_3, f(x_3))(x_3 < -a), Q(x_4, f(x_4))(x_4 \geq -a)$ . 若  $|PQ|$  存在最小值, 则  $a$  的取值范围是  $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ .

其中所有正确结论的序号是\_\_\_\_\_.

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

16. 如图, 在三棱锥  $P-ABC$  中,  $PA \perp$  平面  $ABC$ ,  $PA = AB = BC = 1, PC = \sqrt{3}$ .



- (1) 求证:  $BC \perp$  平面  $PAB$ ;
- (2) 求二面角  $A-PC-B$  的大小.

17. 设函数  $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi \left(\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}\right)$ .

(1) 若  $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 求  $\varphi$  的值.

(2) 已知  $f(x)$  在区间  $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$  上单调递增,  $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$ , 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中

选择一个作为已知, 使函数  $f(x)$  存在, 求  $\omega, \varphi$  的值.

条件①:  $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}$ ;

条件②:  $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$ ;

条件③:  $f(x)$  在区间  $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$  上单调递减.

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (2) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

18. 为研究某种农产品价格变化的规律, 收集得到了该农产品连续 40 天的价格变化数据, 如下表所示. 在描述价格变化时, 用“+”表示“上涨”, 即当天价格比前一天价格高; 用“-”表示“下跌”, 即当天价格比前一天价格低; 用“0”表示“不变”, 即当天价格与前一天价格相同.

时段	价格变化
----	------



第 1 天到第 20 天	-	+	+	0	-	-	-	+	+	0	+	0	-	-	+	-	+	0	0	+
第 21 天到第 40 天	0	+	+	0	-	-	-	+	+	0	+	0	+	-	-	-	+	0	-	+

用频率估计概率.

- (1) 试估计该农产品价格“上涨”的概率;
- (2) 假设该农产品每天的价格变化是相互独立的. 在未来的日子里任取 4 天, 试估计该农产品价格在这 4 天中 2 天“上涨”、1 天“下跌”、1 天“不变”的概率;
- (3) 假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格变化的影响. 判断第 41 天该农产品价格“上涨”“下跌”和“不变”的概率估计值哪个最大. (结论不要求证明)

19. 已知椭圆  $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的离心率为  $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ,  $A, C$  分别是  $E$  的上、下顶点,  $B, D$  分别是  $E$  的左、右顶点,  $|AC| = 4$ .

- (1) 求  $E$  的方程;
- (2) 设  $P$  为第一象限内  $E$  上的动点, 直线  $PD$  与直线  $BC$  交于点  $M$ , 直线  $PA$  与直线  $y = -2$  交于点  $N$ . 求证:  $MN \parallel CD$ .

20. 设函数  $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$ , 曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程为  $y = -x + 1$ .

- (1) 求  $a, b$  的值;
- (2) 设函数  $g(x) = f'(x)$ , 求  $g(x)$  的单调区间;
- (3) 求  $f(x)$  的极值点个数.

21. 已知数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  的项数均为  $m (m > 2)$ , 且  $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$ ,  $\{a_n\}, \{b_n\}$  的前  $n$  项和分别为  $A_n, B_n$ , 并规定  $A_0 = B_0 = 0$ . 对于  $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$ , 定义  $r_k = \max \{i \mid B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$ , 其中,  $\max M$  表示数集  $M$  中最大的数.

- (1) 若  $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$ , 求  $r_0, r_1, r_2, r_3$  的值;
- (2) 若  $a_1 \geq b_1$ , 且  $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}, j = 1, 2, \dots, m-1$ , 求  $r_n$ ;
- (3) 证明: 存在  $p, q, s, t \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$ , 满足  $p > q, s > t$ , 使得  $A_p + B_t = A_q + B_s$ .



## 参考答案

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分. 在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项.

1. 【答案】A

【分析】先化简集合  $M, N$ ，然后根据交集的定义计算.

【详解】由题意， $M = \{x | x + 2 \geq 0\} = \{x | x \geq -2\}$ ， $N = \{x | x - 1 < 0\} = \{x | x < 1\}$ ，

根据交集的运算可知， $M \cap N = \{x | -2 \leq x < 1\}$ .

故选：A

2. 【答案】D

【分析】根据复数的几何意义先求出复数  $z$ ，然后利用共轭复数的定义计算.

【详解】 $z$  在复平面对应的点是  $(-1, \sqrt{3})$ ，根据复数的几何意义， $z = -1 + \sqrt{3}i$ ，

由共轭复数的定义可知， $\bar{z} = -1 - \sqrt{3}i$ .

故选：D

3. 【答案】B

【分析】利用平面向量数量积的运算律，数量积的坐标表示求解作答.

【详解】向量  $\vec{a}, \vec{b}$  满足  $\vec{a} + \vec{b} = (2, 3)$ ， $\vec{a} - \vec{b} = (-2, 1)$ ，

所以  $|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 2 \times (-2) + 3 \times 1 = -1$ .

故选：B

4. 【答案】C

【分析】利用基本初等函数的单调性，结合复合函数的单调性判断 ABC，举反例排除 D 即可.

【详解】对于 A，因为  $y = \ln x$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增， $y = -x$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减，

所以  $f(x) = -\ln x$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减，故 A 错误；

对于 B，因为  $y = 2^x$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增， $y = \frac{1}{x}$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减，

所以  $f(x) = \frac{1}{2^x}$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减，故 B 错误；

对于 C，因为  $y = \frac{1}{x}$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减， $y = -x$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减，

所以  $f(x) = -\frac{1}{x}$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增，故 C 正确；

对于 D，因为  $f\left(\frac{1}{2}\right) = 3^{\left|\frac{1}{2}-1\right|} = 3^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$ ， $f(1) = 3^{|1-1|} = 3^0 = 1$ ， $f(2) = 3^{|2-1|} = 3$ ，

显然  $f(x) = 3^{|x-1|}$  在  $(0, +\infty)$  上不单调，D 错误.



故选：C.

5. 【答案】D

【分析】写出 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式的通项即可

【详解】 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式的通项为 $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r 2^{5-r} C_5^r x^{5-2r}$

令 $5 - 2r = 1$ 得 $r = 2$

所以 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中 $x$ 的系数为 $(-1)^2 2^{5-2} C_5^2 = 80$

故选：D

【点睛】本题考查的是二项式展开式通项的运用，较简单.

6. 【答案】D

【分析】利用抛物线的定义求解即可.

【详解】因为抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点 $F(2, 0)$ ，准线方程为 $x = -2$ ，点 $M$ 在 $C$ 上，

所以 $M$ 到准线 $x = -2$ 的距离为 $|MF|$ ，

又 $M$ 到直线 $x = -3$ 的距离为5，

所以 $|MF| + 1 = 5$ ，故 $|MF| = 4$ .

故选：D.

7. 【答案】B

【分析】利用正弦定理的边角变换与余弦定理即可得解.

【详解】因为 $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$ ，

所以由正弦定理得 $(a+c)(a-c) = b(a-b)$ ，即 $a^2 - c^2 = ab - b^2$ ，

则 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$ ，故 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{ab}{2ab} = \frac{1}{2}$ ，

又 $0 < C < \pi$ ，所以 $C = \frac{\pi}{3}$ .

故选：B.

8. 【答案】C

【分析】解法一：由 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ 化简得到 $x + y = 0$ 即可判断；解法二：证明充分性可由 $x + y = 0$ 得到

$x = -y$ ，代入 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 化简即可，证明必要性可由 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ 去分母，再用完全平方公式即可；解法三：

证明充分性可由 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 通分后用配凑法得到完全平方公式，再把 $x + y = 0$ 代入即可，证明必要性可由



$\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$  通分后用配凑法得到完全平方公式，再把  $x + y = 0$  代入，解方程即可.

【详解】解法一：

因为  $xy \neq 0$ ，且  $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ，

所以  $x^2 + y^2 = -2xy$ ，即  $x^2 + y^2 + 2xy = 0$ ，即  $(x + y)^2 = 0$ ，所以  $x + y = 0$ .

所以“ $x + y = 0$ ”是“ $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ”的充要条件.

解法二：

充分性：因为  $xy \neq 0$ ，且  $x + y = 0$ ，所以  $x = -y$ ，

所以  $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{-y}{y} + \frac{y}{-y} = -1 - 1 = -2$ ，

所以充分性成立；

必要性：因为  $xy \neq 0$ ，且  $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ，

所以  $x^2 + y^2 = -2xy$ ，即  $x^2 + y^2 + 2xy = 0$ ，即  $(x + y)^2 = 0$ ，所以  $x + y = 0$ .

所以必要性成立.

所以“ $x + y = 0$ ”是“ $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ”的充要条件.

解法三：

充分性：因为  $xy \neq 0$ ，且  $x + y = 0$ ，

所以  $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x^2 + y^2 + 2xy - 2xy}{xy} = \frac{(x + y)^2 - 2xy}{xy} = \frac{-2xy}{xy} = -2$ ，

所以充分性成立；

必要性：因为  $xy \neq 0$ ，且  $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ，

所以  $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x^2 + y^2 + 2xy - 2xy}{xy} = \frac{(x + y)^2 - 2xy}{xy} = \frac{(x + y)^2}{xy} - 2 = -2$ ，

所以  $\frac{(x + y)^2}{xy} = 0$ ，所以  $(x + y)^2 = 0$ ，所以  $x + y = 0$ ，

所以必要性成立.

所以“ $x + y = 0$ ”是“ $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ”的充要条件.

故选：C


9. 【答案】C



【分析】先根据线面角的定义求得  $\tan \angle EMO = \tan \angle EGO = \frac{\sqrt{14}}{5}$ ，从而依次求  $EO$ ， $EG$ ， $EB$ ， $EF$ ，

再把所有棱长相加即可得解.

【详解】如图，过  $E$  做  $EO \perp$  平面  $ABCD$ ，垂足为  $O$ ，过  $E$  分别做  $EG \perp BC$ ， $EM \perp AB$ ，垂足分别为  $G$ ， $M$ ，连接  $OG, OM$ ，



由题意得等腰梯形所在的面、等腰三角形所在的面与底面夹角分别为  $\angle EMO$  和  $\angle EGO$ ，

所以  $\tan \angle EMO = \tan \angle EGO = \frac{\sqrt{14}}{5}$ .

因为  $EO \perp$  平面  $ABCD$ ， $BC \subset$  平面  $ABCD$ ，所以  $EO \perp BC$ ，

因为  $EG \perp BC$ ， $EO, EG \subset$  平面  $EOG$ ， $EO \cap EG = E$ ，

所以  $BC \perp$  平面  $EOG$ ，因为  $OG \subset$  平面  $EOG$ ，所以  $BC \perp OG$ ，

同理： $OM \perp BM$ ，又  $BM \perp BG$ ，故四边形  $OMBG$  是矩形，

所以由  $BC = 10$  得  $OM = 5$ ，所以  $EO = \sqrt{14}$ ，所以  $OG = 5$ ，

所以在直角三角形  $EOG$  中， $EG = \sqrt{EO^2 + OG^2} = \sqrt{(\sqrt{14})^2 + 5^2} = \sqrt{39}$

在直角三角形  $EBG$  中， $BG = OM = 5$ ， $EB = \sqrt{EG^2 + BG^2} = \sqrt{(\sqrt{39})^2 + 5^2} = 8$ ，

又因为  $EF = AB - 5 - 5 = 25 - 5 - 5 = 15$ ，

所有棱长之和为  $2 \times 25 + 2 \times 10 + 15 + 4 \times 8 = 117$  m.

故选：C

#### 10. 【答案】B

【分析】法 1：利用数列归纳法可判断 ACD 正误，利用递推可判断数列的性质，故可判断 B 的正误.

法 2：构造  $f(x) = \frac{1}{4}(x-6)^3 + 6 - x$ ，利用导数求得  $f(x)$  的正负情况，再利用数学归纳法判断得各选项

$a_n$  所在区间，从而判断  $\{a_n\}$  的单调性；对于 A，构造  $h(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 47 (x \leq 3)$ ，判断得

$a_{n+1} < a_n - 1$ ，进而取  $m = -[M] + 4$  推得  $a_n > M$  不恒成立；对于 B，证明  $a_n$  所在区间同时证得后续结论；

对于 C，记  $m_0 = \log_3 \left[ 2 \log_{\frac{1}{4}} (M-6) + 1 \right]$ ，取  $m = [m_0] + 1$  推得  $a_n > M$  不恒成立；对于 D，构造

$g(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 49 (x \geq 9)$ ，判断得  $a_{n+1} > a_n + 1$ ，进而取  $m = [M] + 1$  推得  $a_n < M$  不恒成立.





【详解】法1: 因为  $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$ , 故  $a_{n+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3$ ,

对于 A, 若  $a_1 = 3$ , 可用数学归纳法证明:  $a_n - 6 \leq -3$  即  $a_n \leq 3$ ,

证明: 当  $n = 1$  时,  $a_1 - 6 = -3 \leq -3$ , 此时不等关系  $a_n \leq 3$  成立;

设当  $n = k$  时,  $a_k - 6 \leq -3$  成立,

则  $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \in \left(-54, -\frac{27}{4}\right)$ , 故  $a_{k+1} - 6 \leq -3$  成立,

由数学归纳法可得  $a_n \leq 3$  成立.

而  $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 - (a_n - 6) = (a_n - 6) \left[ \frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \right]$ ,

$\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \geq \frac{9}{4} - 1 = \frac{5}{4} > 0$ ,  $a_n - 6 < 0$ , 故  $a_{n+1} - a_n < 0$ , 故  $a_{n+1} < a_n$ ,

故  $\{a_n\}$  为减数列, 注意  $a_{k+1} - 6 \leq -3 < 0$

故  $a_{n+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 = (a_n - 6) \times \frac{1}{4}(a_n - 6)^2 \leq \frac{9}{4}(a_n - 6)$ , 结合  $a_{n+1} - 6 < 0$ ,

所以  $6 - a_{n+1} \geq \frac{9}{4}(6 - a_n)$ , 故  $6 - a_{n+1} \geq 3\left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}$ , 故  $a_{n+1} \leq 6 - 3\left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}$ ,

若存在常数  $M \leq 0$ , 使得  $a_n > M$  恒成立, 则  $6 - 3\left(\frac{9}{4}\right)^{n-1} > M$ ,

故  $\frac{6-M}{3} > \left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}$ , 故  $n < 1 + \log_{\frac{9}{4}} \frac{6-M}{3}$ , 故  $a_n > M$  恒成立仅对部分  $n$  成立,

故 A 不成立.

对于 B, 若  $a_1 = 5$ , 可用数学归纳法证明:  $-1 \leq a_n - 6 < 0$  即  $5 \leq a_n < 6$ ,

证明: 当  $n = 1$  时,  $-1 \leq a_1 - 6 = -1 \leq 0$ , 此时不等关系  $5 \leq a_n < 6$  成立;

设当  $n = k$  时,  $5 \leq a_k < 6$  成立,

则  $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \in \left(-\frac{1}{4}, 0\right)$ , 故  $-1 \leq a_{k+1} - 6 < 0$  成立即

由数学归纳法可得  $5 \leq a_{k+1} < 6$  成立.

而  $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 - (a_n - 6) = (a_n - 6) \left[ \frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \right]$ ,

$\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 < 0$ ,  $a_n - 6 < 0$ , 故  $a_{n+1} - a_n > 0$ , 故  $a_{n+1} > a_n$ , 故  $\{a_n\}$  为增数列,

若  $M = 6$ , 则  $a_n < 6$  恒成立, 故 B 正确.



对于 C, 当  $a_1 = 7$  时, 可用数学归纳法证明:  $0 < a_n - 6 \leq 1$  即  $6 < a_n \leq 7$ ,

证明: 当  $n = 1$  时,  $0 < a_1 - 6 \leq 1$ , 此时不等关系成立;

设当  $n = k$  时,  $6 < a_k \leq 7$  成立,

则  $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \in \left(0, \frac{1}{4}\right]$ , 故  $0 < a_{k+1} - 6 \leq 1$  成立即  $6 < a_{k+1} \leq 7$

由数学归纳法可得  $6 < a_n \leq 7$  成立.

而  $a_{n+1} - a_n = (a_n - 6) \left[ \frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \right] < 0$ , 故  $a_{n+1} < a_n$ , 故  $\{a_n\}$  为减数列,

又  $a_{n+1} - 6 = (a_n - 6) \times \frac{1}{4}(a_n - 6)^2 \leq \frac{1}{4}(a_n - 6)$ , 结合  $a_{n+1} - 6 > 0$  可得:  $a_{n+1} - 6 \leq (a_1 - 6) \left(\frac{1}{4}\right)^n$ , 所以

$$a_{n+1} \leq 6 + \left(\frac{1}{4}\right)^n,$$

若  $a_{n+1} \leq 6 + \left(\frac{1}{4}\right)^n$ , 若存在常数  $M > 6$ , 使得  $a_n > M$  恒成立,

则  $M - 6 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$  恒成立, 故  $n \leq \log_{\frac{1}{4}}(M - 6)$ ,  $n$  的个数有限, 矛盾, 故 C 错误.

对于 D, 当  $a_1 = 9$  时, 可用数学归纳法证明:  $a_n - 6 \geq 3$  即  $a_n \geq 9$ ,

证明: 当  $n = 1$  时,  $a_1 - 6 = 3 \geq 3$ , 此时不等关系成立;

设当  $n = k$  时,  $a_k \geq 9$  成立,

则  $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \geq \frac{27}{4} > 3$ , 故  $a_{k+1} \geq 9$  成立

由数学归纳法可得  $a_n \geq 9$  成立.

而  $a_{n+1} - a_n = (a_n - 6) \left[ \frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \right] > 0$ , 故  $a_{n+1} > a_n$ , 故  $\{a_n\}$  为增数列,

又  $a_{n+1} - 6 = (a_n - 6) \times \frac{1}{4}(a_n - 6)^2 > \frac{9}{4}(a_n - 6)$ , 结合  $a_n - 6 > 0$  可得:

$$a_{n+1} - 6 > (a_1 - 6) \left(\frac{9}{4}\right)^{n-1} = 3 \left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}, \text{ 所以 } a_{n+1} \geq 6 + 3 \left(\frac{9}{4}\right)^{n-1},$$

若存在常数  $M > 0$ , 使得  $a_n < M$  恒成立, 则  $M > 6 + 3 \left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}$ ,

故  $M > 6 + 3 \left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}$ , 故  $n < \log_{\frac{9}{4}} \left(\frac{M - 6}{3}\right) + 1$ , 这与  $n$  的个数有限矛盾, 故 D 错误.

故选: B.



法2: 因为  $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6 - a_n = \frac{1}{4}a_n^3 - \frac{9}{2}a_n^2 + 26a_n - 48$ ,

令  $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 48$ , 则  $f'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 9x + 26$ ,

令  $f'(x) > 0$ , 得  $0 < x < 6 - \frac{2\sqrt{3}}{3}$  或  $x > 6 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ;

令  $f'(x) < 0$ , 得  $6 - \frac{2\sqrt{3}}{3} < x < 6 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ;

所以  $f(x)$  在  $(-\infty, 6 - \frac{2\sqrt{3}}{3})$  和  $(6 + \frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty)$  上单调递增, 在  $(6 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, 6 + \frac{2\sqrt{3}}{3})$  上单调递减,

令  $f(x) = 0$ , 则  $\frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 48 = 0$ , 即  $\frac{1}{4}(x-4)(x-6)(x-8) = 0$ , 解得  $x = 4$  或  $x = 6$  或  $x = 8$ ,

注意到  $4 < 6 - \frac{2\sqrt{3}}{3} < 5$ ,  $7 < 6 + \frac{2\sqrt{3}}{3} < 8$ ,

所以结合  $f(x)$  的单调性可知在  $(-\infty, 4)$  和  $(6, 8)$  上  $f(x) < 0$ , 在  $(4, 6)$  和  $(8, +\infty)$  上  $f(x) > 0$ ,

对于 A, 因为  $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$ , 则  $a_{n+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3$ ,

当  $n = 1$  时,  $a_1 = 3$ ,  $a_2 - 6 = \frac{1}{4}(a_1 - 6)^3 < -3$ , 则  $a_2 < 3$ ,

假设当  $n = k$  时,  $a_k < 3$ ,

当  $n = k + 1$  时,  $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 < \frac{1}{4}(3 - 6)^3 < -3$ , 则  $a_{k+1} < 3$ ,

综上:  $a_n \leq 3$ , 即  $a_n \in (-\infty, 4)$ ,

因为在  $(-\infty, 4)$  上  $f(x) < 0$ , 所以  $a_{n+1} < a_n$ , 则  $\{a_n\}$  为递减数列,

因为  $a_{n+1} - a_n + 1 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6 - a_n + 1 = \frac{1}{4}a_n^3 - \frac{9}{2}a_n^2 + 26a_n - 47$ ,

令  $h(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 47 (x \leq 3)$ , 则  $h'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 9x + 26$ ,

因为  $h'(x)$  开口向上, 对称轴为  $x = -\frac{-9}{2 \times \frac{3}{4}} = 6$ ,

所以  $h'(x)$  在  $(-\infty, 3]$  上单调递减, 故  $h'(x) \geq h'(3) = \frac{3}{4} \times 3^2 - 9 \times 3 + 26 > 0$ ,

所以  $h(x)$  在  $(-\infty, 3]$  上单调递增, 故  $h(x) \leq h(3) = \frac{1}{4} \times 3^3 - \frac{9}{2} \times 3^2 + 26 \times 3 - 47 < 0$ ,



故  $a_{n+1} - a_n + 1 < 0$ ，即  $a_{n+1} < a_n - 1$ ，

假设存在常数  $M \leq 0$ ，使得  $a_n > M$  恒成立，

取  $m = -[M] + 4$ ，其中  $M - 1 < [M] \leq M$ ，且  $[M] \in \mathbb{Z}$ ，

因为  $a_{n+1} < a_n - 1$ ，所以  $a_2 < a_1 - 1, a_3 < a_2 - 1, \dots, a_{-[M]+4} < a_{-[M]+3} - 1$ ，

上式相加得， $a_{-[M]+4} < a_1 - (-[M] + 3) \leq 3 + M - 3 = M$ ，

则  $a_m = a_{[M]+4} < M$ ，与  $a_n > M$  恒成立矛盾，故 A 错误；

对于 B，因为  $a_1 = 5$ ，

当  $n = 1$  时， $a_1 = 5 < 6$ ， $a_2 = \frac{1}{4}(a_1 - 6)^3 + 6 = \frac{1}{4} \times (5 - 6)^3 + 6 < 6$ ，

假设当  $n = k$  时， $a_k < 6$ ，

当  $n = k + 1$  时，因为  $a_k < 6$ ，所以  $a_k - 6 < 0$ ，则  $(a_k - 6)^3 < 0$ ，

所以  $a_{k+1} = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 + 6 < 6$ ，

又当  $n = 1$  时， $a_2 - 5 = \frac{1}{4}(a_1 - 6)^3 + 1 = \frac{1}{4} \times (5 - 6)^3 + 1 > 0$ ，即  $a_2 > 5$ ，

假设当  $n = k$  时， $a_k \geq 5$ ，

当  $n = k + 1$  时，因为  $a_k \geq 5$ ，所以  $a_k - 6 \geq -1$ ，则  $(a_k - 6)^3 \geq -1$ ，

所以  $a_{k+1} = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 + 6 \geq 5$ ，

综上： $5 \leq a_n < 6$ ，

因为在  $(4, 6)$  上  $f(x) > 0$ ，所以  $a_{n+1} > a_n$ ，所以  $\{a_n\}$  为递增数列，

此时，取  $M = 6$ ，满足题意，故 B 正确；

对于 C，因为  $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$ ，则  $a_{n+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3$ ，

注意到当  $a_1 = 7$  时， $a_2 = \frac{1}{4}(7 - 6)^3 + 6 = \frac{1}{4} + 6$ ， $a_3 = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4} + 6 - 6\right)^3 + 6 = \left(\frac{1}{4}\right)^4 + 6$ ，

$$a_4 = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{4}\right)^4 + 6 - 6\right]^3 + 6 = \left(\frac{1}{4}\right)^{13} + 6$$

猜想当  $n \geq 2$  时， $a_k = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^k - 1)} + 6$ ，



当  $n=2$  与  $n=3$  时,  $a_2 = \frac{1}{4} + 6$  与  $a_3 = \left(\frac{1}{4}\right)^4 + 6$  满足  $a_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^n-1)} + 6$ ,

假设当  $n=k$  时,  $a_k = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^k-1)} + 6$ ,

当  $n=k+1$  时, 所以  $a_{k+1} = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 + 6 = \frac{1}{4} \left[ \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^k-1)} + 6 - 6 \right]^3 + 6 = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^{k+1}-1)} + 6$ ,

综上:  $a_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^n-1)} + 6 (n \geq 2)$ ,

易知  $3^n - 1 > 0$ , 则  $0 < \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^n-1)} < 1$ , 故  $a_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^n-1)} + 6 \in (6, 7) (n \geq 2)$ ,

所以  $a_n \in (6, 7]$ ,

因为在  $(6, 8)$  上  $f(x) < 0$ , 所以  $a_{n+1} < a_n$ , 则  $\{a_n\}$  为递减数列,

假设存在常数  $M > 6$ , 使得  $a_n > M$  恒成立,

记  $m_0 = \log_3 \left[ 2 \log_{\frac{1}{4}} (M - 6) + 1 \right]$ , 取  $m = [m_0] + 1$ , 其中  $m_0 - 1 < [m_0] \leq m_0, m_0 \in \mathbb{N}^*$ ,

则  $3^m > 3^{m_0} = 2 \log_{\frac{1}{4}} (M - 6) + 1$ ,

故  $\frac{1}{2}(3^m - 1) > \log_{\frac{1}{4}} (M - 6)$ , 所以  $\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^m-1)} < M - 6$ , 即  $\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^m-1)} + 6 < M$ ,

所以  $a_m < M$ , 故  $a_n > M$  不恒成立, 故 C 错误;

对于 D, 因为  $a_1 = 9$ ,

当  $n=1$  时,  $a_2 - 6 = \frac{1}{4}(a_1 - 6)^3 = \frac{27}{4} > 3$ , 则  $a_2 > 9$ ,

假设当  $n=k$  时,  $a_k \geq 9$ ,

当  $n=k+1$  时,  $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \geq \frac{1}{4}(9 - 6)^3 > 3$ , 则  $a_{k+1} > 9$ ,

综上:  $a_n \geq 9$ ,

因为在  $(8, +\infty)$  上  $f(x) > 0$ , 所以  $a_{n+1} > a_n$ , 所以  $\{a_n\}$  为递增数列,

因为  $a_{n+1} - a_n - 1 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6 - a_n - 1 = \frac{1}{4}a_n^3 - \frac{9}{2}a_n^2 + 26a_n - 49$ ,

令  $g(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 49 (x \geq 9)$ , 则  $g'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 9x + 26$ ,



因为  $g'(x)$  开口向上, 对称轴为  $x = -\frac{-9}{2 \times \frac{3}{4}} = 6$ ,

所以  $g'(x)$  在  $[9, +\infty)$  上单调递增, 故  $g'(x) \geq g'(9) = \frac{3}{4} \times 9^2 - 9 \times 9 + 26 > 0$ ,

所以  $g(x) \geq g(9) = \frac{1}{4} \times 9^3 - \frac{9}{2} \times 9^2 + 26 \times 9 - 49 > 0$ ,

故  $a_{n+1} - a_n - 1 > 0$ , 即  $a_{n+1} > a_n + 1$ ,

假设存在常数  $M > 0$ , 使得  $a_n < M$  恒成立,

取  $m = [M] + 1$ , 其中  $M - 1 < [M] \leq M$ , 且  $[M] \in \mathbb{Z}$ ,

因为  $a_{n+1} > a_n + 1$ , 所以  $a_2 > a_1 + 1, a_3 > a_2 + 1, \dots, a_{[M]+1} > a_{[M]} + 1$ ,

上式相加得,  $a_{[M]+1} > a_1 + [M] > 9 + M - 1 > M$ ,

则  $a_m = a_{[M]+1} > M$ , 与  $a_n < M$  恒成立矛盾, 故 D 错误.

故选: B.

**【点睛】** 关键点睛: 本题解决的关键是根据首项给出与通项性质相关的相应的命题, 再根据所得命题结合放缩法得到通项所满足的不等式关系, 从而可判断数列的上界或下界是否成立.

## 二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. **【答案】** 1

**【分析】** 根据给定条件, 把  $x = \frac{1}{2}$  代入, 利用指数、对数运算计算作答.

**【详解】** 函数  $f(x) = 4^x + \log_2 x$ , 所以  $f(\frac{1}{2}) = 4^{\frac{1}{2}} + \log_2 \frac{1}{2} = 2 - 1 = 1$ .

故答案为: 1

12. **【答案】**  $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$

**【分析】** 根据给定条件, 求出双曲线  $C$  的实半轴、虚半轴长, 再写出  $C$  的方程作答.

**【详解】** 令双曲线  $C$  的实半轴、虚半轴长分别为  $a, b$ , 显然双曲线  $C$  的中心为原点, 焦点在  $x$  轴上, 其半焦距  $c = 2$ ,

由双曲线  $C$  的离心率为  $\sqrt{2}$ , 得  $\frac{c}{a} = \sqrt{2}$ , 解得  $a = \sqrt{2}$ , 则  $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{2}$ ,

所以双曲线  $C$  的方程为  $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$ .

故答案为:  $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$



13. 【答案】 ①.  $\frac{9\pi}{4}$  ②.  $\frac{\pi}{3}$

【分析】根据正切函数单调性以及任意角的定义分析求解.

【详解】因为  $f(x) = \tan x$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  上单调递增, 若  $0 < \alpha_0 < \beta_0 < \frac{\pi}{2}$ , 则  $\tan \alpha_0 < \tan \beta_0$ ,

取  $\alpha = 2k_1\pi + \alpha_0, \beta = 2k_2\pi + \beta_0, k_1, k_2 \in \mathbf{Z}$ ,

则  $\tan \alpha = \tan(2k_1\pi + \alpha_0) = \tan \alpha_0, \tan \beta = \tan(2k_2\pi + \beta_0) = \tan \beta_0$ , 即  $\tan \alpha < \tan \beta$ ,

令  $k_1 > k_2$ , 则  $\alpha - \beta = (2k_1\pi + \alpha_0) - (2k_2\pi + \beta_0) = 2(k_1 - k_2)\pi + (\alpha_0 - \beta_0)$ ,

因为  $2(k_1 - k_2)\pi \geq 2\pi, -\frac{\pi}{2} < \alpha_0 - \beta_0 < 0$ , 则  $\alpha - \beta = 2(k_1 - k_2)\pi + (\alpha_0 - \beta_0) > \frac{3\pi}{2} > 0$ ,

即  $k_1 > k_2$ , 则  $\alpha > \beta$ .

不妨取  $k_1 = 1, k_2 = 0, \alpha_0 = \frac{\pi}{4}, \beta_0 = \frac{\pi}{3}$ , 即  $\alpha = \frac{9\pi}{4}, \beta = \frac{\pi}{3}$  满足题意.

故答案为:  $\frac{9\pi}{4}; \frac{\pi}{3}$ .

14. 【答案】 ①. 48 ②. 384

【分析】方法一: 根据题意结合等差、等比数列的通项公式列式求解  $d, q$ , 进而可求得结果; 方法二: 根据等比中项求  $a_7, a_3$ , 在结合等差、等比数列的求和公式运算求解.

【详解】方法一: 设前 3 项的公差为  $d$ , 后 7 项公比为  $q > 0$ ,

则  $q^4 = \frac{a_9}{a_5} = \frac{192}{12} = 16$ , 且  $q > 0$ , 可得  $q = 2$ ,

则  $a_3 = 1 + 2d = \frac{a_5}{q^2}$ , 即  $1 + 2d = 3$ , 可得  $d = 1$ ,

空 1: 可得  $a_3 = 3, a_7 = a_3 q^4 = 48$ ,

空 2:  $a_1 + a_2 + \dots + a_9 = 1 + 2 + 3 + 3 \times 2 + \dots + 3 \times 2^6 = 3 + \frac{3(1-2^7)}{1-2} = 384$

方法二: 空 1: 因为  $\{a_n\}, 3 \leq n \leq 7$  为等比数列, 则  $a_7^2 = a_5 a_9 = 12 \times 192 = 48^2$ ,

且  $a_n > 0$ , 所以  $a_7 = 48$ ;

又因为  $a_5^2 = a_3 a_7$ , 则  $a_3 = \frac{a_5^2}{a_7} = 3$ ;

空 2: 设后 7 项公比为  $q > 0$ , 则  $q^2 = \frac{a_5}{a_3} = 4$ , 解得  $q = 2$ ,



可得  $a_1 + a_2 + a_3 = \frac{3(a_1 + a_3)}{2} = 6, a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 = \frac{a_3 - a_9 q}{1 - q} = \frac{3 - 192 \times 2}{1 - 2} = 381,$

所以  $a_1 + a_2 + \dots + a_9 = 6 + 381 - a_3 = 384.$

故答案为: 48; 384.

15. 【答案】②③

【分析】先分析  $f(x)$  的图像, 再逐一分析各结论; 对于①, 取  $a = \frac{1}{2}$ , 结合图像即可判断; 对于②, 分段讨论  $f(x)$  的取值范围, 从而得以判断; 对于③, 结合图像可知  $|MN|$  的范围; 对于④, 取  $a = \frac{4}{5}$ , 结合图像可知此时  $|PQ|$  存在最小值, 从而得以判断.


【详解】依题意,  $a > 0,$

当  $x < -a$  时,  $f(x) = x + 2,$  易知其图像为一条端点取不到值的单调递增的射线;

当  $-a \leq x \leq a$  时,  $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2},$  易知其图像是, 圆心为  $(0,0)$ , 半径为  $a$  的圆在  $x$  轴上方的图像 (即半圆);

当  $x > a$  时,  $f(x) = -\sqrt{x} - 1,$  易知其图像是一条端点取不到值的单调递减的曲线;

对于①, 取  $a = \frac{1}{2},$  则  $f(x)$  的图像如下,



显然, 当  $x \in (a-1, +\infty),$  即  $x \in \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$  时,  $f(x)$  在  $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$  上单调递增, 故①错误;

对于②, 当  $a \geq 1$  时,

当  $x < -a$  时,  $f(x) = x + 2 < -a + 2 \leq 1;$

当  $-a \leq x \leq a$  时,  $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$  显然取得最大值  $a;$


当  $x > a$  时,  $f(x) = -\sqrt{x} - 1 < -\sqrt{a} - 1 \leq -2,$

综上:  $f(x)$  取得最大值  $a,$  故②正确;

对于③, 结合图像, 易知在  $x_1 = a, x_2 > a$  且接近于  $x = a$  处,

$M(x_1, f(x_1))(x_1 \leq a), N(x_2, f(x_2))(x_2 > a)$  的距离最小,






当  $x_1 = a$  时,  $y = f(x_1) = 0$ , 当  $x_2 > a$  且接近于  $x = a$  处,  $y_2 = f(x_2) < -\sqrt{a} - 1$ ,

此时,  $|MN| > y_1 - y_2 > \sqrt{a} + 1 > 1$ , 故③正确;

对于④, 取  $a = \frac{4}{5}$ , 则  $f(x)$  的图像如下,



因为  $P(x_3, f(x_3)) (x_3 < -a), Q(x_4, f(x_4)) (x_4 \geq -a)$ ,

结合图像可知, 要使  $|PQ|$  取得最小值, 则点  $P$  在  $f(x) = x + 2 \left( x < -\frac{4}{5} \right)$  上, 点  $Q$  在

$$f(x) = \sqrt{\frac{16}{25} - x^2} \left( -\frac{4}{5} \leq x \leq \frac{4}{5} \right),$$

同时  $|PQ|$  的最小值为点  $O$  到  $f(x) = x + 2 \left( x < -\frac{4}{5} \right)$  的距离减去半圆的半径  $a$ ,

此时, 因为  $f(x) = y = x + 2 \left( x < -\frac{4}{5} \right)$  的斜率为 1, 则  $k_{OP} = -1$ , 故直线  $OP$  的方程为  $y = -x$ ,

联立  $\begin{cases} y = -x \\ y = x + 2 \end{cases}$ , 解得  $\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$ , 则  $P(-1, 1)$ ,

显然  $P(-1, 1)$  在  $f(x) = x + 2 \left( x < -\frac{4}{5} \right)$  上, 满足  $|PQ|$  取得最小值,

即  $a = \frac{4}{5}$  也满足  $|PQ|$  存在最小值, 故  $a$  的取值范围不仅仅是  $\left( 0, \frac{1}{2} \right]$ , 故④错误.

故答案为: ②③.

**【点睛】** 关键点睛: 本题解决的关键是分析得  $f(x)$  的图像, 特别是当  $-a \leq x \leq a$  时,  $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$



的图像为半圆，解决命题④时，可取特殊值进行排除即可。

**三、解答题：本题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

16. 【答案】(1) 证明见解析

(2)  $\frac{\pi}{3}$

【分析】(1) 先由线面垂直的性质证得  $PA \perp BC$ ，再利用勾股定理证得  $BC \perp PB$ ，从而利用线面垂直的判定定理即可得证；

(2) 结合 (1) 中结论，建立空间直角坐标系，分别求得平面  $PAC$  与平面  $PBC$  的法向量，再利用空间向量夹角余弦的坐标表示即可得解。

【小问 1 详解】

因为  $PA \perp$  平面  $ABC, BC \subset$  平面  $ABC$ ,

所以  $PA \perp BC$ ，同理  $PA \perp AB$ ，

所以  $\triangle PAB$  为直角三角形，

又因为  $PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{2}$ ， $BC = 1, PC = \sqrt{3}$ ，

所以  $PB^2 + BC^2 = PC^2$ ，则  $\triangle PBC$  为直角三角形，故  $BC \perp PB$ ，


又因为  $BC \perp PA$ ， $PA \cap PB = P$ ，

所以  $BC \perp$  平面  $PAB$ 。

【小问 2 详解】

由 (1)  $BC \perp$  平面  $PAB$ ，又  $AB \subset$  平面  $PAB$ ，则  $BC \perp AB$ ，

以  $A$  为原点， $AB$  为  $x$  轴，过  $A$  且与  $BC$  平行的直线为  $y$  轴， $AP$  为  $z$  轴，建立空间直角坐标系，如图，



则  $A(0, 0, 0), P(0, 0, 1), C(1, 1, 0), B(1, 0, 0)$ ，

所以  $\overrightarrow{AP} = (0, 0, 1), \overrightarrow{AC} = (1, 1, 0), \overrightarrow{BC} = (0, 1, 0), \overrightarrow{PC} = (1, 1, -1)$ ，

设平面  $PAC$  的法向量为  $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$ ，则  $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases}$ ，即  $\begin{cases} z_1 = 0, \\ x_1 + y_1 = 0, \end{cases}$

令  $x_1 = 1$ ，则  $y_1 = -1$ ，所以  $\vec{m} = (1, -1, 0)$ ，



设平面  $PBC$  的法向量为  $\vec{n} = (x_2, y_2, z_2)$ , 则  $\begin{cases} n \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ n \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \end{cases}$ , 即  $\begin{cases} y_2 = 0 \\ x_2 + y_2 - z_2 = 0 \end{cases}$ ,

令  $x_2 = 1$ , 则  $z_2 = 1$ , 所以  $\vec{n} = (1, 0, 1)$ ,

$$\text{所以 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

又因为二面角  $A-PC-B$  为锐二面角,

所以二面角  $A-PC-B$  的大小为  $\frac{\pi}{3}$ .

17. 【答案】(1)  $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ .

(2) 条件①不能使函数  $f(x)$  存在; 条件②或条件③可解得  $\omega = 1$ ,  $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ .

【分析】(1) 把  $x = 0$  代入  $f(x)$  的解析式求出  $\sin \varphi$ , 再由  $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$  即可求出  $\varphi$  的值;

(2) 若选条件①不合题意; 若选条件②, 先把  $f(x)$  的解析式化简, 根据  $f(x)$  在  $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$  上的单调性及函数的最值可求出  $T$ , 从而求出  $\omega$  的值; 把  $\omega$  的值代入  $f(x)$  的解析式, 由  $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$  和  $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$  即可求出  $\varphi$  的值; 若选条件③: 由  $f(x)$  的单调性可知  $f(x)$  在  $x = -\frac{\pi}{3}$  处取得最小值  $-1$ , 则与条件②所给的条件一样, 解法与条件②相同.

【小问 1 详解】

因为  $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$ ,  $\omega > 0$ ,  $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$

$$\text{所以 } f(0) = \sin(\omega \cdot 0) \cos \varphi + \cos(\omega \cdot 0) \sin \varphi = \sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

因为  $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ .

【小问 2 详解】

因为  $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$ ,  $\omega > 0$ ,  $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ ,

所以  $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ,  $\omega > 0$ ,  $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $f(x)$  的最大值为 1, 最小值为  $-1$ .

若选条件①: 因为  $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$  的最大值为 1, 最小值为  $-1$ , 所以  $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}$  无解, 故条件①不能使函数  $f(x)$  存在;



若选条件②：因为  $f(x)$  在  $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$  上单调递增，且  $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=1$ ， $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-1$

所以  $\frac{T}{2} = \frac{2\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \pi$ ，所以  $T = 2\pi$ ， $\omega = \frac{2\pi}{T} = 1$ ，

所以  $f(x) = \sin(x + \varphi)$ ，

又因为  $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$ ，所以  $\sin\left(-\frac{\pi}{3} + \varphi\right) = -1$ ，

所以  $-\frac{\pi}{3} + \varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，

所以  $\varphi = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，因为  $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ ，所以  $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ 。

所以  $\omega = 1$ ， $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ ；

若选条件③：因为  $f(x)$  在  $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$  上单调递增，在  $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$  上单调递减，

所以  $f(x)$  在  $x = -\frac{\pi}{3}$  处取得最小值  $-1$ ，即  $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$ 。

以下与条件②相同。

18. 【答案】(1) 0.4

(2) 0.168

(3) 不变

【分析】(1) 计算表格中的 + 的次数，然后根据古典概型进行计算；

(2) 分别计算出表格中上涨，不变，下跌的概率后进行计算；

(3) 通过统计表格中前一次上涨，后一次发生的各种情况进行推断第 41 天的情况。

【小问 1 详解】

根据表格数据可以看出，40 天里，有 16 个 +，也就是有 16 天是上涨的，

根据古典概型的计算公式，农产品价格上涨的概率为： $\frac{16}{40} = 0.4$

【小问 2 详解】

在这 40 天里，有 16 天上涨，14 天下跌，10 天不变，也就是上涨，下跌，不变的概率分别是 0.4，0.35，0.25，

于是未来任取 4 天，2 天上涨，1 天下跌，1 天不变的概率是  $C_4^2 \times 0.4^2 \times C_2^1 \times 0.35 \times 0.25 = 0.168$

【小问 3 详解】

由于第 40 天处于上涨状态，从前 39 次的 15 次上涨进行分析，上涨后下一次仍上涨的有 4 次，不变的有 9 次，下跌的有 2 次，



因此估计第41次不变的概率最大.

19. 【答案】(1)  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

(2) 证明见解析

【分析】(1) 结合题意得到  $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ,  $2b = 4$ , 再结合  $a^2 - c^2 = b^2$ , 解之即可;

(2) 依题意求得直线  $BC$ 、 $PD$  与  $PA$  的方程, 从而求得点  $M, N$  的坐标, 进而求得  $k_{MN}$ , 再根据题意求得  $k_{CD}$ , 得到  $k_{MN} = k_{CD}$ , 由此得解.

【小问1详解】

依题意, 得  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ , 则  $c = \frac{\sqrt{5}}{3}a$ ,

又  $A, C$  分别为椭圆上下顶点,  $|AC| = 4$ , 所以  $2b = 4$ , 即  $b = 2$ ,


所以  $a^2 - c^2 = b^2 = 4$ , 即  $a^2 - \frac{5}{9}a^2 = \frac{4}{9}a^2 = 4$ , 则  $a^2 = 9$ ,

所以椭圆  $E$  的方程为  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

【小问2详解】

因为椭圆  $E$  的方程为  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ , 所以  $A(0, 2), C(0, -2), B(-3, 0), D(3, 0)$ ,

因为  $P$  为第一象限  $E$  上的动点, 设  $P(m, n)(0 < m < 3, 0 < n < 2)$ , 则  $\frac{m^2}{9} + \frac{n^2}{4} = 1$ ,



易得  $k_{BC} = \frac{0+2}{-3-0} = -\frac{2}{3}$ , 则直线  $BC$  的方程为  $y = -\frac{2}{3}x - 2$ ,

$k_{PD} = \frac{n-0}{m-3} = \frac{n}{m-3}$ , 则直线  $PD$  的方程为  $y = \frac{n}{m-3}(x-3)$ ,

联立  $\begin{cases} y = -\frac{2}{3}x - 2 \\ y = \frac{n}{m-3}(x-3) \end{cases}$ , 解得  $\begin{cases} x = \frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6} \\ y = \frac{-12n}{3n+2m-6} \end{cases}$ , 即  $M\left(\frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6}, \frac{-12n}{3n+2m-6}\right)$ ,



而  $k_{PA} = \frac{n-2}{m-0} = \frac{n-2}{m}$ , 则直线  $PA$  的方程为  $y = \frac{n-2}{m}x + 2$ ,

令  $y = -2$ , 则  $-2 = \frac{n-2}{m}x + 2$ , 解得  $x = \frac{-4m}{n-2}$ , 即  $N\left(\frac{-4m}{n-2}, -2\right)$ ,

又  $\frac{m^2}{9} + \frac{n^2}{4} = 1$ , 则  $m^2 = 9 - \frac{9n^2}{4}$ ,  $8m^2 = 72 - 18n^2$ ,

$$\text{所以 } k_{MN} = \frac{\frac{-12n}{3n+2m-6} + 2}{\frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6} - \frac{-4m}{n-2}} = \frac{(-6n+4m-12)(n-2)}{(9n-6m+18)(n-2) + 4m(3n+2m-6)}$$

$$= \frac{-6n^2 + 4mn - 8m + 24}{9n^2 + 8m^2 + 6mn - 12m - 36} = \frac{-6n^2 + 4mn - 8m + 24}{9n^2 + 72 - 18n^2 + 6mn - 12m - 36}$$

$$= \frac{-6n^2 + 4mn - 8m + 24}{-9n^2 + 6mn - 12m + 36} = \frac{2(-3n^2 + 2mn - 4m + 12)}{3(-3n^2 + 2mn - 4m + 12)} = \frac{2}{3},$$

又  $k_{CD} = \frac{0+2}{3-0} = \frac{2}{3}$ , 即  $k_{MN} = k_{CD}$ ,

显然,  $MN$  与  $CD$  不重合, 所以  $MN \parallel CD$ .

20. 【答案】(1)  $a = -1, b = 1$

(2) 答案见解析 (3) 3 个

【分析】(1) 先对  $f(x)$  求导, 利用导数的几何意义得到  $f(1) = 0$ ,  $f'(1) = -1$ , 从而得到关于  $a, b$  的方程组, 解之即可;

(2) 由 (1) 得  $g(x)$  的解析式, 从而求得  $g'(x)$ , 利用数轴穿根法求得  $g'(x) < 0$  与  $g'(x) > 0$  的解, 由此求得  $g(x)$  的单调区间;

(3) 结合 (2) 中结论, 利用零点存在定理, 依次分类讨论区间  $(-\infty, 0)$ ,  $(0, x_1)$ ,  $(x_1, x_2)$  与  $(x_2, +\infty)$  上  $f'(x)$  的零点的情况, 从而利用导数与函数的极值点的关系求得  $f(x)$  的极值点个数.

【小问 1 详解】

因为  $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$ ,  $x \in \mathbf{R}$ , 所以  $f'(x) = 1 - (3x^2 + ax^3)e^{ax+b}$ ,

因为  $f(x)$  在  $(1, f(1))$  处的切线方程为  $y = -x + 1$ ,

所以  $f(1) = -1 + 1 = 0$ ,  $f'(1) = -1$ ,

$$\text{则 } \begin{cases} 1 - 1^3 \times e^{a+b} = 0 \\ 1 - (3+a)e^{a+b} = -1 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases},$$

所以  $a = -1, b = 1$ .

【小问 2 详解】



由 (1) 得  $g(x) = f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1} (x \in \mathbf{R})$ ,

则  $g'(x) = -x(x^2 - 6x + 6)e^{-x+1}$ ,

令  $x^2 - 6x + 6 = 0$ , 解得  $x = 3 \pm \sqrt{3}$ , 不妨设  $x_1 = 3 - \sqrt{3}$ ,  $x_2 = 3 + \sqrt{3}$ , 则  $0 < x_1 < x_2$ ,

易知  $e^{-x+1} > 0$  恒成立,

所以令  $g'(x) < 0$ , 解得  $0 < x < x_1$  或  $x > x_2$ ; 令  $g'(x) > 0$ , 解得  $x < 0$  或  $x_1 < x < x_2$ ;

所以  $g(x)$  在  $(0, x_1)$ ,  $(x_2, +\infty)$  上单调递减, 在  $(-\infty, 0)$ ,  $(x_1, x_2)$  上单调递增,

即  $g(x)$  的单调递减区间为  $(0, 3 - \sqrt{3})$  和  $(3 + \sqrt{3}, +\infty)$ , 单调递增区间为  $(-\infty, 0)$  和  $(3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})$ .

**【小问 3 详解】**

由 (1) 得  $f(x) = x - x^3e^{-x+1} (x \in \mathbf{R})$ ,  $f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1}$ ,

由 (2) 知  $f'(x)$  在  $(0, x_1)$ ,  $(x_2, +\infty)$  上单调递减, 在  $(-\infty, 0)$ ,  $(x_1, x_2)$  上单调递增,

当  $x < 0$  时,  $f'(-1) = 1 - 4e^2 < 0$ ,  $f'(0) = 1 > 0$ , 即  $f'(-1)f'(0) < 0$

所以  $f'(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上存在唯一零点, 不妨设为  $x_3$ , 则  $-1 < x_3 < 0$ ,

此时, 当  $x < x_3$  时,  $f'(x) < 0$ , 则  $f(x)$  单调递减; 当  $x_3 < x < 0$  时,  $f'(x) > 0$ , 则  $f(x)$  单调递增;

所以  $f(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上有一个极小值点;

当  $x \in (0, x_1)$  时,  $f'(x)$  在  $(0, x_1)$  上单调递减,

则  $f'(x_1) = f'(3 - \sqrt{3}) < f'(1) = 1 - 2 < 0$ , 故  $f'(0)f'(x_1) < 0$ ,

所以  $f'(x)$  在  $(0, x_1)$  上存在唯一零点, 不妨设为  $x_4$ , 则  $0 < x_4 < x_1$ ,

此时, 当  $0 < x < x_4$  时,  $f'(x) > 0$ , 则  $f(x)$  单调递增; 当  $x_4 < x < x_1$  时,  $f'(x) < 0$ , 则  $f(x)$  单调递减;

所以  $f(x)$  在  $(0, x_1)$  上有一个极大值点;

当  $x \in (x_1, x_2)$  时,  $f'(x)$  在  $(x_1, x_2)$  上单调递增,

则  $f'(x_2) = f'(3 + \sqrt{3}) > f'(3) = 1 > 0$ , 故  $f'(x_1)f'(x_2) < 0$ ,

所以  $f'(x)$  在  $(x_1, x_2)$  上存在唯一零点, 不妨设为  $x_5$ , 则  $x_1 < x_5 < x_2$ ,

此时, 当  $x_1 < x < x_5$  时,  $f'(x) < 0$ , 则  $f(x)$  单调递减; 当  $x_5 < x < x_2$  时,  $f'(x) > 0$ , 则  $f(x)$  单调递增;

所以  $f(x)$  在  $(x_1, x_2)$  上有一个极小值点;

当  $x > x_2 = 3 + \sqrt{3} > 3$  时,  $3x^2 - x^3 = x^2(3 - x) < 0$ ,



所以  $f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1} > 0$ , 则  $f(x)$  单调递增,

所以  $f(x)$  在  $(x_2, +\infty)$  上无极值点;

综上:  $f(x)$  在  $(-\infty, 0)$  和  $(x_1, x_2)$  上各有一个极小值点, 在  $(0, x_1)$  上有一个极大值点, 共有 3 个极值点.

**【点睛】** 关键点睛: 本题第 3 小题的解题关键是判断  $f'(x_1)$  与  $f'(x_2)$  的正负情况, 充分利用  $f'(x)$  的单调性, 寻找特殊点判断即可得解.

21. **【答案】** (1)  $r_0 = 0, r_1 = 1, r_2 = 2, r_3 = 3$

(2)  $r_n = n, n \in \mathbf{N}$

(3) 证明见详解

**【分析】** (1) 先求  $A_0, A_1, A_2, A_3, B_0, B_1, B_2, B_3$ , 根据题意分析求解;

(2) 根据题意分析可得  $r_{i+1} - r_i \geq 1$ , 利用反证可得  $r_{i+1} - r_i = 1$ , 在结合等差数列运算求解;

(3) 讨论  $A_m, B_m$  的大小, 根据题意结合反证法分析证明.

**【小问 1 详解】**

由题意可知:  $A_0 = 0, A_1 = 2, A_2 = 3, A_3 = 6, B_0 = 0, B_1 = 1, B_2 = 3, B_3 = 6$ ,

当  $k = 0$  时, 则  $B_0 = A_0 = 0, B_i > A_0, i = 1, 2, 3$ , 故  $r_0 = 0$ ;

当  $k = 1$  时, 则  $B_0 < A_1, B_1 < A_1, B_i > A_1, i = 2, 3$ , 故  $r_1 = 1$ ;

当  $k = 2$  时, 则  $B_i \leq A_2, i = 0, 1, 2, B_3 > A_2$ , 故  $r_2 = 2$ ;

当  $k = 3$  时, 则  $B_i \leq A_3, i = 0, 1, 2, 3$ , 故  $r_3 = 3$ ;

综上所述:  $r_0 = 0, r_1 = 1, r_2 = 2, r_3 = 3$ .

**【小问 2 详解】**

由题意可知:  $r_n \leq m$ , 且  $r_n \in \mathbf{N}$ ,

因为  $a_n \geq 1, b_n \geq 1$ , 则  $A_n \geq a_1 = 1, B_n \geq b_1 = 1$ , 当且仅当  $n = 1$  时, 等号成立,

所以  $r_0 = 0, r_1 = 1$ ,

又因为  $2r_i \leq r_{i-1} + r_{i+1}$ , 则  $r_{i+1} - r_i \geq r_i - r_{i-1}$ , 即  $r_m - r_{m-1} \geq r_{m-1} - r_{m-2} \geq \cdots \geq r_1 - r_0 = 1$ ,

可得  $r_{i+1} - r_i \geq 1$ ,

反证: 假设满足  $r_{n+1} - r_n > 1$  的最小正整数为  $1 \leq j \leq m-1$ ,

当  $i \geq j$  时, 则  $r_{i+1} - r_i \geq 2$ ; 当  $i \leq j-1$  时, 则  $r_{i+1} - r_i = 1$ ,

则  $r_m = (r_m - r_{m-1}) + (r_{m-1} - r_{m-2}) + \cdots + (r_1 - r_0) + r_0 \geq 2(m-j) + j = 2m - j$ ,

又因为  $1 \leq j \leq m-1$ , 则  $r_m \geq 2m - j \geq 2m - (m-1) = m+1 > m$ ,

假设不成立, 故  $r_{n+1} - r_n = 1$ ,

即数列  $\{r_n\}$  是以首项为 1, 公差为 1 的等差数列, 所以  $r_n = 0 + 1 \times n = n, n \in \mathbf{N}$ .

**【小问 3 详解】**





(i) 若  $A_m \geq B_m$ , 构建  $S_n = A_n - B_n, 1 \leq n \leq m$ , 由题意可得:  $S_n \geq 0$ , 且  $S_n$  为整数,

反证, 假设存在正整数  $K$ , 使得  $S_K \geq m$ ,

则  $A_K - B_{r_K} \geq m, A_K - B_{r_{K+1}} < 0$ , 可得  $b_{r_{K+1}} = B_{r_{K+1}} - B_{r_K} = (A_K - B_{r_K}) - (A_K - B_{r_{K+1}}) > m$ ,

这与  $b_{r_{K+1}} \in \{1, 2, \dots, m\}$  相矛盾, 故对任意  $1 \leq n \leq m, n \in \mathbf{N}$ , 均有  $S_n \leq m-1$ .

①若存在正整数  $N$ , 使得  $S_N = A_N - B_{r_N} = 0$ , 即  $A_N = B_{r_N}$ ,

可取  $r = p = 0, q = N, s = r_N$ , 使得  $A_p + B_s = A_q + B_r$ ;

②若不存在正整数  $N$ , 使得  $S_N = 0$ ,

因为  $S_n \in \{1, 2, \dots, m-1\}$ , 且  $1 \leq n \leq m$ ,

所以必存在  $1 \leq X < Y \leq m$ , 使得  $S_X = S_Y$ ,

即  $A_X - B_{r_X} = A_Y - B_{r_Y}$ , 可得  $A_X + B_{r_Y} = A_Y + B_{r_X}$ ,

可取  $p = X, s = r_Y, q = Y, r = r_X$ , 使得  $A_p + B_s = A_q + B_r$ ;

(ii) 若  $A_m < B_m$ , 构建  $S_n = B_n - A_n, 1 \leq n \leq m$ , 由题意可得:  $S_n \leq 0$ , 且  $S_n$  为整数,

反证, 假设存在正整数  $K$ , 使得  $S_K \leq -m$ ,

则  $B_{r_K} - A_K \leq -m, B_{r_{K+1}} - A_K > 0$ , 可得  $b_{r_{K+1}} = B_{r_{K+1}} - B_{r_K} = (B_{r_{K+1}} - A_K) - (B_{r_K} - A_K) > m$ ,

这与  $b_{r_{K+1}} \in \{1, 2, \dots, m\}$  相矛盾, 故对任意  $1 \leq n \leq m, n \in \mathbf{N}$ , 均有  $S_n \geq 1-m$ .

①若存在正整数  $N$ , 使得  $S_N = B_{r_N} - A_N = 0$ , 即  $A_N = B_{r_N}$ ,

可取  $r = p = 0, q = N, s = r_N$ , 使得  $A_p + B_s = A_q + B_r$ ;

②若不存在正整数  $N$ , 使得  $S_N = 0$ ,

因为  $S_n \in \{-1, -2, \dots, 1-m\}$ , 且  $1 \leq n \leq m$ ,

所以必存在  $1 \leq X < Y \leq m$ , 使得  $S_X = S_Y$ ,

即  $B_{r_X} - A_X = B_{r_Y} - A_Y$ , 可得  $A_X + B_{r_Y} = A_Y + B_{r_X}$ ,

可取  $p = X, s = r_Y, q = Y, r = r_X$ , 使得  $A_p + B_s = A_q + B_r$ ;

综上所述: 存在  $0 \leq p < q \leq m, 0 \leq r < s \leq m$  使得  $A_p + B_s = A_q + B_r$ .

**【点睛】** 方法点睛: 对于一些直接说明比较困难的问题, 可以尝试利用反证法分析证明.